Dipartimento di Prevenzione
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Azienda U.L.S.S.15 ALTA PADOVANA Regione del Veneto

Qualche CONSIGLIO UTILE dopo la

VACCINAZIONE

In questo foglietto informativo riportiamo le risposte alle domande più frequenti.
Se desiderate altre informazioni chiamate il vostro servizio vaccinazioni o il Pediatra di fiducia

Dopo la vaccinazione il mio bambino è irrequieto. Che cosa devo fare?

Dopo la vaccinazione i bambini possono apparire particolarmente irrequieti poiché possono sentire dolore nella sede dell'iniezione o avere la febbre.
Si può somministrare loro un farmaco, il "paracetamolo", che aiuta a ridurre il dolore e la febbre; tale sostanza si trova in commercio con il nome di TACHIPIRINA, EFFERALGAN, ecc. (vedi prospetto indicativo con le modalità di somministrazione del farmaco).

La gamba (o il braccio) del mio bambino è calda, gonfia e arrossata. Che cosa devo fare?

Per alleviare il fastidio è sufficiente applicare un panno pulito e fresco (bagnato) sulla zona dolorosa ed infiammata. Se ritenete che il bambino abbia molto dolore poiché reagisce alla minima pressione potete somministrare il paracetamolo come descritto nel prospetto.
Se dopo 24 ore il rossore tende ancora ad aumentare chiamate il pediatra di fiducia o il vostro servizio vaccinale.

Penso che il bambino abbia la febbre. Che cosa devo fare?

Se dopo la vaccinazione il bambino sembra caldo e arrossato è importante controllargli la temperatura. È consigliabile misurare la temperatura rettale; la temperatura ascellare è in genere più bassa e meno attendibile.
La febbre può comparire entro due giorni dall'effettuazione della maggior parte dei vaccini. Solo per i vaccini contro il morbillo-parotite-rosolia e varicella, la febbre ed eventualmente l'esantema (puntini rossi diffusi sul corpo) possono comparire dopo 7/26 giorni.

Se il bambino ha la febbre:

- dategli da bere in abbondanza
- vestitelo in modo leggero senza coprirlo eccessivamente
- fategli un bagno in acqua tiepida (non fredda)
- somministrategli paracetamolo e non acido-acetilsalicilico (aspirina)

Se la febbre persiste o tende ad aumentare, o se il bambino presenta sintomi inusuali, consultate il pediatra di fiducia o chiamate il vostro centro vaccinale.

DOSE DI PARACETAMOLO (es. Tachipirina)
da somministrare ogni 4 – 6 ore

Supposte (mg)	Gocce	Sciroppo (ml)
1 da 125 per 5-10 kg di peso **1 da 250 per 11-22 kg di peso** **1 da 500 oltre i 23 kg di peso**	**3 gocce ogni kg di peso**	**½ ml ogni kg di peso**

Per ogni dubbio o preoccupazione chiamate il SERVIZIO VACCINALE e RICORDATEVI di annotare e riferire qualsiasi cosa riteniate utile.

Servizio vaccinale di: